



Escisión de Loop

¿Qué es escisión con asa y procedimiento de escisión electro quirúrgica con asa?

Escisión electro-quirúrgica con asa (loop) es un tipo de tratamiento de cirugía, que consiste en extirpar tejido anormal del cuello uterino. Para el procedimiento se utiliza un instrumento pequeño de alambre con una corriente eléctrica especial. Normalmente se extrae uno a dos pedazos pequeños del cérvix (tamaño de tres monedas juntas) Estas muestras se envían al patológico para asegurar que todas las células anormales han sido extraídas y no exista más compromiso del tejido o seriedad de la enfermedad. Después del procedimiento escisión de loop, células normales regeneran. La mayoría de mujeres se alivian tan bien que es difícil saber que tuvieron una cirugía.

¿Porque necesito escisión de loop? En caso que Su último examen de Papanicolaou detectara células anormales en su cérvix. Es imprescindible un examen de colposcopia, el cual permite una visión ampliada e iluminada del cérvix mejorando la distinción de células anormales precancerosas, ante la presencia de estas células anormales, se realiza la toma de un pequeño tejido llamado biopsia cervical, si el resultado de la biopsia cervical confirma la presencia de displasia (células anormales) de alto grado. se trata de un pre cáncer que posteriormente estaría evolucionando a un cáncer en un periodo de 1 a 4 años, **Para prevenir que usted desarrolle cáncer cervical, estas células anormales deben de ser extraídas. Escisión loop es un modo que células displásicas anormales se extraigan de su cérvix.**


¿En qué momento me pueden realizar el procedimiento de loop? Usted puede sacar su cita para el procedimiento de escisión Loop inmediatamente comunicándose con nosotros. Este procedimiento debe realizarse antes o después de su periodo menstrual. NO se realiza el procedimiento de loop en mujeres embarazadas. Si existe sospecha que puede estar embarazada, por favor notifíquese con nosotros hoy. Escisión loop no se debe de realizar cuando tiene infección cervical o vaginal. Si usted tiene secreción vaginal anormal, secreción con mal olor, comezón en labios y vagina, fiebre, o dolor en su bajo vientre, por favor notifíquese con nosotros inmediatamente.

¿En dónde se ara el procedimiento de loop? El procedimiento de loop se hace en CERVICUSCO, probablemente en el mismo consultorio en donde se hizo la colposcopia. Puede ser que este una pantalla para video en el consultorio para que usted pueda ver todo el procedimiento, No tendrá que ir a una sala de operaciones o quedarse hospitalizada. El procedimiento es ambulatorio es decir no se internara.

¿Qué hago para prepararme ante el tratamiento? Lo mejor para prepararse para su cita es relajarse. No hay razón para preocuparse. Ya hemos reevaluado sus exámenes de Papanicolaou, Colposcopia, Biopsia. Las buenas noticias es que se puede tratar muy fácil y rápidamente.

- Puede tomar 400mg de ibuprofeno (1 tableta) o la medicina que normalmente toma para sus dolores menstruales por lo menos 1 hora antes del tratamiento de escisión loop. La medicación disminuye los dolores que son como cólicos menstruales, durante o después del procedimiento.
- Si usted tiene problemas de coagulación, (hemofilia), un marcapasos para corazón, toma medicamentos (como una aspirina diario, heparina), experiencia de aliviarse difícil, tiene alergia a cualquier medicinas, o yoda, historia de diabetes o problemas de válvula del corazón, por favor Comuníquenos antes del procedimiento.
- Se le va a pedir que se quite todas sus Joyas de metal antes del procedimiento. Por eso, es mejor que acuda al procedimiento sin joyas .

¿Qué pasa durante el procedimiento? Antes del procedimiento, se le volverá a explicar el procedimiento y los posibles riesgos y cuidados. Se le va a pedir que firme un consentimiento informado indicando que usted entiende los riesgos, y complicaciones potentes relacionados con el procedimiento y que está de acuerdo con el tratamiento. Después, se va a recostar en la mesa de examen con sus pies soportados en el estribo. Sus cérvix se va a visualizar con mucho cuidado usando un espejo vaginal, y Colposcopio. Un parche grande, se le va a colocar encima de la rodilla con una venda. Este parche quita la energía eléctrica que se usa para el procedimiento cuando realicen el corte del cérvix. No debe de sentir energía. Usando un colposcopio, un tipo de microscopio que se queda afuera de su cuerpo, permite magnificar el cérvix con una visión ampliada e iluminada, para identificar las células anormales otra vez, su cérvix va a ser pintado con vinagre que hace que las células anormales se hagan blancas temporalmente. Después se coloca una solución de yodo que hace que las células anormales se pongan amarillas y los tejidos normales se pongan color café. El cérvix se va a anestésiar con varias inyecciones de anestesia local . El anestésico es igual al tipo que recibe en consultorio del dentista antes de curar una caries. Algunas mujeres no sienten las inyecciones, pero otras pueden sentir un pellizco rápido. Después, va a oír un sonido como una aspiradora. Este sonido se hace con un evacuador de humo que saca el humo de sitio de cirugía. Puede ser que pueda oler, el olor de humo durante el procedimiento. El instrumentó para loop, es usado para extraer los tejidos anormales del cérvix. Cuando todos los tejidos anormales se han secado, la base de la zona cortada va a ser cauterizada para evitar hemorragia. Esto quiere decir que una corriente especial se va a usar para sellar y cerrar los vasos sanguíneos. Una medicina color mostaza se le va a colocar en el cérvix para evitar sangrado. La ciruja de loop dura uno o dos minutos. Después de que el tejido anormal se ha extraído, se envía a un laboratorio para un examen con mucho cuidado con microscopio. El entero procedimiento normalmente se completa en menos de 30 minutos.



¿Qué tan efectivo es la escisión de loop? Un tratamiento singular de escisión de loop se puede esperar que cure 85% a 95% de mujeres. Mujeres con lesiones muy grandes o lesiones muy profundas puede esperarse bajo curamiento. Fracaso de tratamiento es más alto en mujeres que fuman productos de tabaco, que en mujeres que no fuman. Puede subir su posibilidad que sea un éxito su tratamiento si no

fuma. Finalmente, su examen de Papanicolaou puede ser que no sea enteramente normales después de cirugía de escisión loop por varias razones. Un resultado anormal de bajo grado puede ser que no necesite más tratamiento.

¿Qué debería de esperar después del tratamiento? Inmediatamente después de la cirugía, va a tener una secreción fina y rosada a transparente. (Por la cirugía) o secreción gruesa café-negra de color (normalmente por resultado de la cauterización y medicamentos que se aplicaron al último del procedimiento). Puede ser que sienta un poco de dolor, como cuando esta menstruando. Se puede tratar con aspirina, ibuprofeno, naproxeno o la medicina que normalmente toma para sus dolores menstruales. Puede ser que presente un poco de machas vaginales. Sangrando más pesado que su menstruación normal durante las primeras 48 horas después de la cirugía, se debe de reportar con nosotros inmediatamente. Sangrando un poco más pesado se puede notar durante su siguiente periodo menstrual, pero esto se considera normal.

¿Cuáles son los riesgos de escisión de Loop? El procedimiento escisión de loop se considera una cirugía menor segura. Al mismo tiempo, como cualquier tipo de cirugía puede tener algunas complicaciones. Estas complicaciones de escisión de loop incluyen:

- **Sangrando:** Un poco de sangre se espera durante la escisión de loop. De vez en cuando sangrando excesivo se puede esperar. Ay muchos modos para evitar la hemorragia de cirugía. Podemos usar cauterización eléctrica especial o agentes químicos para sellar y cerrar los vasos sanguíneos, o en raros casos coser y cerrar la herida. Si ninguno de estos métodos son éxitos, una histerectomía de emergencia, puede ser necesaria para salvar su vida. Es muy remoto que cualquier hemorragia sea tan grave que esto sea necesario.
- **Estenosis Cervical:** Cuando su cérvix se está aliviando de su tratamiento, tejidos nuevos y sanos van a crecer para reponer los tejidos anormales que se quitaron. Unas mujeres desarrollan cicatrices grandes cuando fueron tratadas con escisión LOOP . Consecuentemente, hay veces que el tejido crece de un modo, que los tejidos de la cicatriz cubre el pasaje cervical haciéndolo más cerrado. (abertura en el cérvix) este tipo de cierre puede hacer más difícil el embarazo o prevenir la salida normal de la menstruación . Si esto ocurre, puede ser que después se necesite un procedimiento de cirugía menor, para estirar o volver a abrir el orificio cervical. la Estenosis Cervical (cierre de orificio cervical) ocurre en menos de cinco por ciento de que tiene escisión loop simple. Estenosis Cervical ocurre mas frecuente en mujeres que no tiene periodos y tienen células anormales profundas, extraído cervical por procedimiento de conización.
- **Incompetencia Cervical:** cuando se regenera su cérvix, el orificio cervical puede ser que no sea tan cerrado o apretado como estaba antes del tratamiento. Si este es el caso al momento de salir embarazada las complicaciones son de mantener la gestación, Este problema es muy fácil de resolver, para ello temporalmente se cose la abertura del cérvix y cuando la gestación este a término se corta las puntadas del cérvix. la Incompetencia cervical es más posible que pase si a células anormales han sido extraídas profundamente o por procedimiento de conización
- **Infección:** El riesgo es mínimo (menos de cinco por ciento) de infección de los órganos de la pelvis después de la cirugía. Esto es particular si tiene una infección vaginal o cervical antes de escisión

de loop. Si usted tiene dolor de bajo vientre , fiebre o secreción vaginal con mal olor después del tratamiento, es posible que tenga una infección. Consúltenos inmediatamente para poder evaluar y después tratar esas infecciones con antibióticos.

¿Cómo me cuido después del tratamiento? No tenga relaciones sexuales por una a dos semanas para dar tiempo de que la herida se cure y regenere.

- No use lavado vaginal o Tampones por una a dos semanas.
- Si sangra más de dos semanas, llámenos.
- secreciones vaginales de color café-negro o rosado es normal por unas cuantas semanas. Pero, si tiene una secreción que tiene mal olor y está acompañado con dolor de bajo vientre, y fiebre llámenos inmediatamente.
- Si comienza a sangrar, sangre roja viva con coagulo llámenos inmediatamente.
- Si fuma productos de tabaco, ¡evitelos!
- **Lo más importante**, regrese por una cita de seguimiento y examen de Papanicolaou tres, seis, y doce meses después de su cirugía. No podemos determinar si su tratamiento fue un éxito hasta que ha tenido 2 controles consecutivos de exámenes normales, seis y doce meses después de tratamiento.
- Presentarse a sus citas es muy importante, Por favor comuníquese con Cervicusco si no pueden llegar a cualquiera de sus citas. También, comuníquese con nosotros de cambios en su domicilio, número de teléfono. Por si sus tratamiento no fue un éxito, su cita de seguimiento de Papanicolaou, y examen de colposcopia puede detectar lo que sobra o nuevas células anormales, para poder tratar tejidos anormales otra vez y prevenir que se haga cáncer. Con que su examen de Papanicolaou salga normal durante el primer año después de la cirugía, usted debe de tener un examen de Papanicolaou una vez al año por el resto de su vida.

¿Qué debo de hacer si no puedo venir a mi cita? A veces no se puede venir a la cita por varias razones. Si usted no nos comunica para cancelar su cita cuando está programada, otra mujer que también necesitaba cita no se pudo atender. Por favor llámenos lo más pronto posible si usted sabe que no va a poder venir para dar la oportunidad a otra mujer. ¡Gracias!

¿A quien le puedo hablar si tengo preguntas? Estamos contentos de contestar cualquier pregunta que tenga. Es muy normal que este un poquito nerviosa sobre este procedimiento, así como si fuera cualquier otra cirugía. Puede estar más en tranquila sabiendo que hemos hecho este procedimiento escisión loop electrocirugía muy bien por muchos años. Si tiene alguna pregunta antes o después de la cirugía, por favor llame a CerviCusco a 273453.